

www.cronicadelasmerindades.com



JUAN ANGEL DE LA TORRE

Biologo

LA GINETA

(Genetta genetta)



■ Se trata de un carnívoro del tamaño de un gato doméstico, unos 40 CMS de longitud con una cola gruesa y anillada de 8 - 10 bandas negras que mide tanto como el cuerpo (35-40 CMS). El animal tiene el cuerpo alargado y esbelto, las patas bastante cortas y unas orejas grandes y redondeadas. Su colorido es pardo grisáceo con unas manchas moteadas negras que tienden a formar líneas a lo largo de su cuerpo. Hay dimorfismo sexual en cuanto al tamaño, siendo los machos algo mayores que las hembras. Su peso no sobrepasa los 1,3 Kg. Sus huellas son muy parecidas a las de los gatos. Acostumbran a defecar en cagarruteros o letrinas en huecos de las peñas donde se acumulan muchos excrementos que, en fresco, son oscuros, largos, retorcidos y no huelen mal y de viejos se tornan blanquecinos.

Se distribuye por África, Arabia y el sureste europeo, aunque se sabe que en Europa no vivía en épocas prehistóricas por que no se han encontrado fósiles de genet.

Viven en habitats variados pero sus preferencias son bosques, roquedos y matorrales donde encuentren refugios seguros. Tiende a vivir en zonas templadas o cálidas y muy especialmente en las riberas de los ríos.

Puede estar en celo entre Enero y Septiembre, durando su gestación entre 10 y 11 semanas. Suelen parir entre 2 y 3 crías que nacen muy poco desarrolladas. La época de partos más común es Abril-Mayo.

Pueden alimentarse de prácticamente todo lo que cacen, aves de campo y de corral, mamíferos hasta el tamaño de una liebre, reptiles, anfibios, cangrejos, frutos, hierba etc. Aunque son especialmente hábiles en la captura de los ratones de campo.

Entre sus congéneres se conocen y diferencian por los marcajes de olor,

pudiendo conocer los machos el estado receptivo o no de las hembras. Se comportan de forma territorial evitando entrometerse unos individuos donde detectan a otros.

Se dice muy comúnmente que las ginetas fueron introducidas en Iberia por los árabes para controlar a los roedores pero esto no está a día de hoy demostrado.

Las ginetas han sido cazadas y capturadas de múltiples maneras por el hombre, antes por su piel y hoy, especialmente cuando cazan en gallineros desprotegidos.

En la península ibérica la genet es capturada por perros asilvestrados, linces (*Lynx pardinus*) y se han hallado sus huesos en egagrópilas de Búho real (*Bubo bubo*) y Águila real (*Aquila chrysaetos*).

En Las Merindades, hemos podido detectar y a veces observar ginetas en las riberas del Ebro y del Nela (zona Ciguenza-Pedrosa) y en el Valle de Mena.



DE RUTA POR LAS MERINDADES

PEÑA DEL AGUJERO Y ALTOLLANO

Ruta y Fotografías: Carlos Varona

Ruta:

- Salimos de Valhermosa por la parte alta del pueblo junto a la ermita, por una pista que lleva a una granja, antes de llegar a ella nos desviamos a la izquierda, por un camino junto a un muro de piedra, (este camino se le denomina camino de Medina de Pomar)
- El camino en continua ascensión y tras una curva a derecha nos lleva al pie de la Peña del Agujero donde hay un cruce de caminos.
- A la izquierda el camino nos lleva primero por camino y luego sin senda hacia la meseta del Altollano 1.063 m. Con vistas de la Sierra de la Tesla el Valle de Valdenoceda, Valle de Tartales de los Montes
- De vuelta al cruce caminos cogemos ahora el de la derecha que bordea la Peña del Agujero hasta un mirador sobre Hoz de Arriba. Justo allí inicia una senda por terreno sucio y a veces muy cerrado que nos lleva al buzón de la Peña del Agujero 1.073 m (esta marcado con plásticos atados en los arbustos aunque a veces es muy difuso)



■ Agujero desde altollano



■ Buzón de la Peña del Agujero, 1.073 m

FICHA TECNICA

INICIO: VALERHERMOSA

CARTOGRAFIA: 136-I IGN TRESPADERNE

PICO: PEÑA DEL AGUJERO 1073 Y

ALTOLLANO 1063

DISTANCIA: 9 Km - DURACIÓN : 2:45 h.

DESNIVEL: 500 m.